


PROGETTO DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE ZANZARE

NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

MONITORAGGIO E LOTTA ALLE ZANZARE AUTOCTONE



Le stazioni di monitoraggio indicano una presenza di *Culex pipiens* contenuta in tutto il territorio monitorato. Ricordiamo che *Culex pipiens* è la zanzara che punge esclusivamente alla sera e per tutta la notte. Marginali, al momento, le catture delle altre principali specie di zanzare autoctone: *Aedes caspius* e *Aedes vexans*.

Il contenimento della Zanzara Tigre al di sotto della soglia di molestia passa necessariamente attraverso il trattamento e la corretta gestione degli innumerevoli focolai di sviluppo di questa specie che sono presenti nelle aree private: tombini, pluviali, secchi, bidoni, piccoli contenitori in genere. Il trattamento regolare a cadenza mensile di tombini e pluviali con gli appositi prodotti larvicidi conduce quasi sempre a un netto miglioramento della situazione. Occorre invece diffidare dei trattamenti adulticidi che portano a un beneficio del tutto transitorio e che, in caso di abuso o uso scorretto, possono avere anche conseguenze sull'ambiente e la salute di tutti. A lato un pluviale fortemente colonizzato da larve di *Aedes albopictus*.

MONITORAGGIO E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

